

INSODEX 480 EC

Obsahuje chlorpyrifos, známu a osvedčenú látku zo skupiny organofosfátov. Vyznačuje sa mimoriadnou efektivitou účinku pri ničení mnohých škodcov. Správne aplikovaný Insodex 480 EC ničí hmyz vyskytujúci sa na repkových poliach vo všetkých jeho vývojových štádiách.

ÚČINOK

Na rastline pôsobí povrchovo i hlbkovo. Škodcov eliminuje kontaktným, fumigačným a požerovým účinkom. Najlepšiu efektivitu garantuje aplikácia prípravku Insodex 480 EC pri teplote nad 15 °C.

V závislosti na pestovaní a termíne ošetrenia môžeme očakávať efektívnu elimináciu škodcov po dobu 2-3 týždňov od aplikácie.

EFEKTIVITA

Účinná látka chlorpyrifos obsiahnutá v prípravku INSODEX ničí širokú škálu škodcov ako sú: skočky, blyskáčik repkový, krytonos repkový, krytonos štvorzubý, kohútiky, vošky, molička kapustová.



HERBICÍDY

Prípravky na ničenie burín.

FUNGICÍDY

Prípravky na ochranu rastlín proti hubovým chorobám.



INSEKTICÍDY

Prípravky na ochranu rastlín pred škodcami.

Kontakt:

INNIGO Agrar CZ s.r.o.
Thámová 137/16
186 00 Praha 8
www.innigo.com

Poradenský servis:

Stella Waldnerová +421 918 735 904
Peter Belan +421 905 454 034
Juraj Arpáš +421 917 222 531



INSODEX 480 EC

A JE PO PROBLÉME...

ZDRAVÁ REPKA BEZ ŠKODCU = NAVÝŠENIE VÝNOSU

Mimoriadne efektívne ničenie škodcov, nevyhnutný nástroj v technológii pestovania repky.

www.innigo.com

Stratégia sekvenčnej aplikácie insekticídov - ochrana proti rezistencii

Pri ničení škodcov je vhodné aplikovať strieda-vo účinné látky z rôznych chemických skupín a s rôznymi mechanizmami účinku tak, aby ne-došlo k vzniku rezistencie. Venujte pozornosť tomu, aké účinné látky sa pri pestovaní použí- vali v predchádzajúcich rokoch a vezmite to do úvahy pri plánovaní ochranného ošetrenia.


DÔLEŽITÉ: všetky prípravky používať v dáv- kach podľa registrácie. Každé zníženie dáv- ky vedie k riziku slabšej efektivity a generuje vznik rezistencie.

O ošetrení rozhodnite vždy na základe monitorovania náletov škodcov

Pozorovať nálety a stanoviť početnosť škod- cov (tzv. Prahy škodlivosti) je základom pri rozhodovaní o ošetrení. Správne zvolený ter- mín ošetrenia je kľúčovým prvkom pre plnú účinnosť insekticídu Insodex 480 EC.

Ekonomické prahy škodlivosti u vybraných najnebezpečnejších škodcov repky

ŠKODCA	OBDOBIE VÝSKYTU	PRAH ŠKODLIVOSTI
Skočky	Po vyklíčení (BBCH 10-15)	1 chrobák na 1 bm riadku
Skočka repková	september - október (BBCH 12-19)	3 chrobáci na 1 bm riadku
Molička kapustová	september - október (BBCH 12-19)	1 húsenica na rastline
Krytonos kapustový	september - október (BBCH 12-19)	2-3 chrobáci v žltej nádobe za 3 dni
Piliarka repková	september - október (BBCH 12-19)	1 húsenica na rastline
Plodomor kapustový	september - október (BBCH 12-19)	Nedostupné
Kvetárka kapustová	september - november (BBCH 12-19)	1 kvetárka v žltej nádobe za 3 dni
Krytonos repkový	od začiatku do konca marca (BBCH 20-19)	10 chrobákov v žltej nádobe za 3 dni alebo 2-4 chrobáky na 25 rastlinách
Krytonos štvorzubý	prelom marca a apríla (BBCH 25-39)	20 chrobákov v žltej nádobe alebo 6 chrobákov na 25 rastlinách
Krytonos šesťušový	prelom apríla a mája (BBCH 60-69)	4 chrobáky na 25 rastlinách
Blyskáčik repkový	prilbovito kryté kvety (BBCH 50-52)	1 chrobák na rastline
	jednotlivé kvety (BBCH 53-59)	3-5 chrobákov na rastline
Byľomor kelový	od začiatku opadávanie kvetných lupeňov (BBCH 65-69)	1 dospelý hmyz na 4 rastliny



INSODEX 480 EC

PROFIL PRODUKTU PODĽA REGISTRAČNÉHO ŠTÍTKU

Typ prípravku	Insekticíd s kontaktným, požerovým a inhalačným účinkovaním proti škodcom v repke ozimnej
Účinná látka	Chlorpyrifos (zlučenina zo skupiny organofosfátov 480 g/l) (44,4%hm)
Formulácia	EC - koncentrát pre prípravu vodnej emulzie
Plodina	Repka ozimná
Účel použitia	Krytonos repkový, blyskáčik repkový
Odporúčaná dávka	0,6 l / ha Ochranná doba 70 dní
Termín aplikácie	Krytonos repkový: Porasty repky ozimnej ošetrte na začiatku náletu chrobákov do porastu, t.j. pri zistení 6 imág za 3 dni v Mörickeho miskách. Blyskáčik repkový: Aplikujte 7-10 dní po prvých náletoch škodcov vo vývojovej fáze repky BBCH 51-53 (zelený púčik - vyvinuté kvetné puky nad mladšími listami).
Odporúčané množstvo vody	150-400 l/ha
Odporúčané postrekače	Na stredne veľké kvapky

Pridaním adjuvantu Adjuvinn zvýšite efektivitu ošetrenie insekticídom Insodex 480 EC

NEZABUDNITE! Pri používaní prípravkov na ochranu rastlín zachovajte bezpečnosť. Pred každým použitím si prečítajte informácie na etikete a informácie o produkte. Venujte pozornosť vetám označujúcim špecifickú rizikovosť a zaistite bezpečnostné opatrenia uvedené na štítku.