

HERBISTAR 200 EC

PROFIL PRODUKTU PODĽA REGISTRAČNÉHO ŠTÍTKU

Typ prípravku	herbicíd vo forme emulzného koncentráту určený na postemergentnú likvidáciu jednoročných dvojkličnolistových burín v pšenici ozimnej, tritikale, raži a jačmeni jarnom
Účinná látka	fluroxypyr 200 g/l; 19,9 % w/w
Formulácia	EC - emulzný koncentrát
Plodina	pšenica ozimná, tritikale, raž ozimná, jačmeň jarný
Účel použitia	jednoročné dvojkličnolistové buriny
Odporúčaná dávka	pšenica ozimná, tritikale, raž ozimná: 0,6 - 1,0 l/ha, 0,4 - 0,6 l/ha + (20 g) SUPERHERB 20 SG jačmeň jarný: 0,25 - 0,4 l/ha + (20 g) SUPERHERB 20 SG
Termín aplikácie	pšenica ozimná, tritikale, raž ozimná: aplikujte na jar pri teplotách nad +8°C až do rastovej fázy, keď je 2. kolienko min. 2 cm nad 1. kolienkom (BBCH 26 – 32). jačmeň jarný: aplikujte v rastovej fáze od začiatku do konca odnožovania (BBCH 21-29).
Odporúčané množstvo vody	200-300 l/ha

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Dávka: 0,6 l/ha

Citlivé buriny: nevädza poľná, hviezdica prostredná, konopnica napuchnutá, lipkavec obyčajný, pohánkovec ovíjavý, kapsička pastierska, peniažtek roľný.
Stredne citlivé buriny: fialka roľná, hluchavka purpurová, parumanček nevoňavý.

Dávka: 1,0 l/ha:

Citlivé buriny: nevädza poľná, hviezdica prostredná, parumanček nevoňavý, konopnica napuchnutá, lipkavec obyčajný, pohánkovec ovíjavý, kapsička pastierska, peniažtek roľný.
Stredne citlivé buriny: fialka roľná, hluchavka purpurová, veronika perzská, výmrv repky.



HERBICÍDY

Prípravky na ničenie burín.

FUNGICÍDY

Prípravky na ochranu rastlín proti hubovým chorobám.



INSEKTICÍDY


Prípravky na ochranu rastlín pred škodcami.

Kontakt:

INNVIKO Agrar CZ s.r.o.
Thámova 137/16
186 00 Praha 8
www.innvigo.com

Poradenský servis:

Stella Waldnerová +421 918 735 904
Peter Belan +421 905 454 034
Juraj Arpáš +421 917 222 531



TRISTAR 50 SG

HERBISTAR 200 EC

Herbicídy určené na likvidáciu dvojkličnolistových burín v hustosiatych obilninách.

Vyznačujú sa variabilitou riešení ako v sólo aplikáciách tak i v spoločnom TMixe.

www.innvigo.com

TRISTAR 50 SG

PROFIL PRODUKTU PODĽA REGISTRAČNÉHO ŠTÍTKU

Typ prípravku	herbicídny prípravok vo forme granúl rozpustných vo vode, určený na ničenie dvojkličnolistových burín v pšenici ozimnej, tritikale a jačmeni jarnom.
Účinná látka	Tribenuron-metyl 500 g/kg (50 % w/w)
Formulácia	SG - vodou rozpustné granule
Plodina	pšenica ozimná, tritikale, jačmeň jarný
Účel použitia	jednoročné dvojkličnolistové buriny, pichliač roľný
Odporúčaná dávka	pšenica ozimná, tritikale: 30-40 g/ha jačmeň jarný: 25-30 g/ha
Termín aplikácie	pšenica ozimná, tritikale: aplikujte vo fáze 2-6 pravých listov burín (BBCH 12-16) jačmeň jarný: aplikujte vo fáze 2-4 pravých listov burín (BBCH 12-14)
Odporúčané množstvo vody	200-300 l/ha

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Pšenica ozimná, tritikale :

TRISTAR 50 SG 40 g/ha

Citlivé buriny - pichliač roľný, hluchavka objímavá, hluchavka purpurová, peniažtek roľný, parmanček nevoňavý

Stredne citlivé buriny - fialka roľná

Jačmeň jarný

TRISTAR 50 SG 30 g/ha

Citlivé buriny - parmanček nevoňavý, nevädza poľná


Menej citlivé buriny - fialka roľná, lipkavec obyčajný, peniažtek roľný, mrlík biely, hluchavka objímavá.

TRISTAR 50 SG + HERBISTAR 200 EC = SILNÝ A HARMONICKÝ ÚČINOK

Spojením prípravkov Tristar 50 SG a Herbistar 200 EC do spoločného TMixu získame mimoriadne efektívnu herbicídnu sadu, ktorá ničí viac ako 25 ťažkých burín na čele s lipkavcom. Efekty účinku sú pozorovateľné už po 2-3 dňoch od aplikácie. Plný herbicídny efekt dosiahneme po 7-21 dňoch od aplikácie. Obe látky sú zároveň bezpečné pre

následné plodiny. Použitím účinných látok tribenuron-methyl a fluroxypyr spájame dva odlišné mechanizmy ničenia burín. Výsledkom je dobre fungujúca herbicídna sad. Zároveň tým zabraňujeme vzniku rezistencie burín na jednotlivé účinné látky.

Doporučenie pre ozimnú pšenicu



Doporučenie pre jarný jačmeň

