

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Pšenica ozimná, tritikale, raž ozimná

Prípravok aplikujte od začiatku odnožovania, do rastovej fázy, kedy je prvé kolienko min. 1 cm nad odnožovacím uzlom (BBCH 21-31). Pre zvýšenie citlivosti burín v ozimných obilninách (hlavne lipkavec obyčajný a výmrav repky) aplikujte prípravok SUPERHERB 20 SG spolu s prípravkom HERBISTAR 200 EC v predpísanej dávke.


Jačmeň jarný

Prípravok aplikujte v rastovej fáze od začiatku do konca odnožovania (BBCH 21-30).

Na zvýšenie herbicídnej účinnosti prípravku na stredne citlivé a v podmienkach, ktoré majú negatívny vplyv na pôsobenie prípravku SUPERHERB 20 SG (sucho, nízke teploty) je vhodné pridať zmáčadlo ADJUVINN.


DOPORUČENIE PRE OZIMNÚ PŠENICU, RAŽ OZIMNÁ A TRITIKALE

SUPERHERB 20 SG + ADJUVVIN	30 g/ha 50 ml/ha	jednoročné dvojklíč. buriny
SUPERHERB 20 SG + HERBISTAR 200 EC 0,4-0,6 l/ha	20 g/ha 50 ml/ha	jednoročné dvojklíč. Buriny +lipkavec obyčajný



DOPORUČENIE PRE JARNÝ JAČMEŇ

SUPERHERB 20 SG + ADJUVVIN	20 g/ha 50 ml/ha	jednoročné dvojklíč. buriny
SUPERHERB 20 SG + HERBISTAR 200 EC 0,25-0,4 l/ha	20 g/ha 50 ml/ha	jednoročné dvojklíč. buriny +lipkavec obyčajný




HERBICÍDY

Prípravky na ničenie burín.

FUNGICÍDY

Prípravky na ochranu rastlín proti hubovým chorobám.



INSEKTICÍDY


Prípravky na ochranu rastlín pred škodcami.

Kontakt:

INNIGO Agrar CZ s.r.o.
Thámová 137/16
186 00 Praha 8
www.innigo.com

Poradenský servis:

Stella Waldnerová +421 918 735 904
Peter Belan +421 905 454 034
Juraj Arpáš +421 917 222 531



TYTAN 75 SG

SUPERHERB 20 SG

TVOJI SKUTOČNÝ POMOCNÍCI!

www.innigo.com

TYTAN 75 SG

Profil prípravku podľa registrácie

Typ prípravku	TYTAN 75 SG je herbicíd vo forme vodou rozpustných granúl, určený na likvidáciu dvojkličnolistových burín a metličky v pšenici ozimnej.
Účinná látka	Thifensulfuron-methyl, 682 g.kg-1 (68.2 % hm) Metsulfuron-methyl, 68 g.kg-1 (6.8 % hm)
Formulácia	SG - vodou rozpustné granule
Plodina	pšenica ozimná
Oporúčaná dávka	70 - 90 g/ha v závislosti na rastovej fáze burín
Pokyny pre aplikáciu	Prípravok aplikujte výlučne len na jar, od objavenia sa 2. odnože, do rastovej fázy, kedy je 1. kolienko min. 1 cm nad odnožovacím uzlom (BBCH 22-31).
Použitie zmáčadla	Pri nepriaznivých podmienkach ako je sucho sa s prípravkom TYTAN 75 SG doporučuje aplikovať zmáčadlo ADJUVVIN.
Dávka vody	200-300 l/ha

TYTAN 75 SG je herbicíd vo forme vodou rozpustných granúl, určený na likvidáciu dvojkličnolistových burín a metličky v pšenici ozimnej. Metsulfuron i tifensulfuron methyl kombinované v modernej SG formulácii herbicídu, ktorý je bezpečný od prvých vývojových štádií obilniny s rýchlym prienikom do zelených častí burín.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Látky s rôznym mechanizmom účinku zvyšujú účinnosť herbicídneho zásahu a tiež zabraňujú tvorbu rezistentných burín.

POZOR! Pri príprave TMIx zmesí s inými prípravkami je dôležité prečítať si etikety jednotlivých prípravkov. Vhodné je vykonať skúšku miešateľnosti jednotlivých prípravkov pred aplikáciou.

NEZABUDNITE! Prípravky na ochranu rastlín vždy používajte v súlade so schválenou etiketou. Dôkladne si prečítajte informácie na štítku.

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI

Citlivé buriny: fialka roľná, hviezdica prostredná, hluchavka purpurová, mak vlčí, parumanček nevoňavý, nezábudka roľná, výmrv repky, peniažtek roľný.

Stredne citlivé buriny: metlička obyčajná, lipkavec obyčajný a veronika perzská.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Najlepší herbicídny účinok sa dosiahne pri aplikácii prípravku na mladé, intenzívne rastúce buriny v štádiu klíčnych až 4 pravých listov..


Vyššiu dávku aplikujte v prípade ak sú buriny v pokročilejších vývojových fázach. Nevyhnutnou súčasťou je aplikácia spolu so zmáčadlom ADJUVINN najmä v suchom počasí a pri nízkych teplotách.

FLEXIBILITA

Prípravok sa vyznačuje vysokou flexibilitou v použití s inými herbicídmi. Na zvýšenie účinnosti proti pre-rastenému lipkavcu je možný TMIx s prípravkom s obsahom fl uroxypiru. Pre ničenie metličky obýčajnej s prípravkami na báze účinných látok isoproturon, chlorotoluron alebo diflufenicanu.

DOPORUČENIE PRE OŠETRENIE PŠENICE OZIMNEJ

TYTAN 75 SG + ADJUVVIN	70-90 g/ha 50 ml/ha	jednoročné dvojklič, buriny (dávka prípravku podľa rastovej fázy burín)
TYTAN 75 SG + HERBISTAR 200 EC	70 g/ha 0,4 l/ha	jednoročné dvojklič, buriny + lipkavec obyčajný
TYTAN 75 SG + isoproturon 500	70 g/ha 1,5 l/ha	jednoročné dvojklič, buriny + metlička obyčajná



SUPERHERB 20 SG

PROFIL PRÍPRAVKU PODĽA REGISTRÁCIE

Typ prípravku	herbicíd vo forme vodou rozpustných granúl, určený na ničenie jednoročných dvojkličnolistových burín v pšenici ozimnej, tritikale, raži ozimnej a jačmeni jarnom
Účinná látka	Metsulfuron-methyl 200 g/kg (20% hm)
Formulácia	SG - vodou rozpustné granule
Plodina	pšenica ozimná, tritikale, raž ozimná, jačmeň jarný
Účel použitia	jednoročné dvojkličnolistové buriny
Odporúčaná dávka	pšenica ozimná, tritikale, raž ozimná: 30 g 20 g + (0,4-0,6 l) HERBISTAR 200 EC jačmeň jarný: 20 g 20 g + (0,25-0,4 l) HERBISTAR 200 EC
Termín aplikácie	pšenica ozimná, tritikale, raž ozimná: aplikujte od začiatku odnožovania, do rastovej fázy, kedy je prvé kolienko min. 1 cm nad odnožovacím uzlom (BBCH 21-31). jačmeň jarný: aplikujte v rastovej fáze od začiatku do konca odnožovania (BBCH 21-30).
Odporúčané množstvo vody	200-300 l/ha

SPEKTRUM ÚČINKU

Prípravok SUPERHERB 20 SG aplikovaný samostatne:

Citlivé buriny: fialka roľná, hviezdica prostredná, hluchavka purpurová, hluchavka objímavá, mak vlčí, parumanček nevoňavý, konopnica napuchnutá, pohánkovec ovíjavý, kapsička pastierska a peniažtek roľný.

Stredne citlivé buriny: nevädza poľná, mrlík biely, veronika perzská, výmrv repky.

Tank-mix SUPERHERB 20 SG+GALAPER 200 EC (HERBISTAR 200 EC):

Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, výmrv repky, nevädza poľná, fialka roľná, hviezdica prostredná, hluchavka purpurová, hluchavka objímavá, mrlík biely, mak vlčí, parumanček nevoňavý, konopnica napuchnutá, pohánkovec ovíjavý, kapsička pastierska a peniažtek roľný.